


OTITIS EXTERNA OTITIS MEDIA

Dr Komol Praphasit ENT PPK







การนับถุงแก้วหูข้างซ้าย





OTITIS EXTERNA

- มักพบในเขตร้อนชื้น แคะหู น้ำเข้าหู
 - *S. aureus*, *P. aeruginosa*
 - ปวดหู บวมมากจะได้ยินลดลง ปวดเมื่อถูกกดที่ **targus** และขยับใบหู
 - พยาธิสภาพ
 - Acute diffuse OE (swimmer's ear) - *P. aeruginosa*
 - Acute localized OE (furuncle) - *S. aureus*
 - Rx...ทำความสะอาดหู ให้ยาหยดหู บวมมากใส่ **ear wick**
 - *Four principles of Rx.*
 - Frequent canal cleaning
 - Topical antibiotics
 - Pain control
 - Instructions for prevention

















When the ear canal is swollen shut an effective way of expanding the ear canal is to use an 'ear wick'. These are inserted into the ear canal in their dry compressed state (photograph, left). Eardrops cause them to swell (photograph, right) and mould to the shape of the canal. They help to deliver ear drops into the canal and should be changed daily.

Chronic otitis externa

-- diffuse low grade infection

- irritation & iching of EAC

- atrophy of skin

- cause bacteria *staph. Epidermidis*

asteatosis

senile atrophy of skin

chronic irritation from allergy or manipulation

Rx. Get rid of infection — steroid/antibiotic cream —

Malignant otitis externa

- *Pseudo. Aeruginosa*
- progressive & necrosis of tissue
- common in DM old age cancer pt.
With radiation or chemo therapy
- toxin...cause... necrotizing & invade to
deep tissue : mastoid CN 7,9,10,11,12

Malignant otitis externa

- S/S :
 - persistent and severe otalgia
 - ear d/c granulation tissue EAC
 - host...DM or immunocompromise
 - CN involvement: 7,,9,10,11,12
- Ix:- CBC UA FBS pus c/s
 - x-ray:CT,MRI of temporal bone

Malignant otitis externa


Rx. - admit

- control DM
- local debridement
- I.V. ATB cover *P. aeruginosa*
- topical gentamicin ear drop
- if less severe... oral Ciproflox.


If..

No improve or progress-->

mastoidectomy, temporalbone resection







การติดเชื้อที่หูชั้นกลาง (*otitis media*)

พบบ่อยในเด็ก อายุ < 7 ปี

- สาเหตุที่พบบ่อย

- Eustachian tube obstruction

- Allergy , infection , immature / impair

- immune

- other : day care center , passive smoking

- lack of breast feeding

If

Eustachian tube & otitis media



Function of ET : 1. Ventilation

2. Protection

3. Drainage

factors alteration of ET-function


- poor function in children
- patulous ET
- mechanical obstruction:
 - intrinsic... inflammation/ allergy
 - extrinsic...adenoid ,NP mass




Tensor veli palatini muscle contracts during swallowing and opens the eustachian tube.

Tensor veli palatini muscle is relaxed and the eustachian tube is closed.


INFANT EAR





ADULT EAR



mation of the middle ear.







หูชี้นกลางอักเสบเฉียบพลัน (*Acute otitis media*)

Etiology: Streptococcal pneumoniae

Hemophilus influenzae

Branhamella catarrhalis

other organism : gr. A strept. S. aureus P. aeruginosa

Symptoms & signs:

- fever , otalgia , pus d/c , eardrum....swelling redness
- dullness , air-fluid level

Treatment

1. Antibiotics : penicillin / amoxicillin...#

other .bactrim , erythromycin , cefaclor ,

Augmentin


#.....Treat....10 – 14 days

2. Analgesics & antipyritics


3. Myringotomy ...Severe otalgia, for c/s

complication...*facial paralysis*, low -immune host


Amoxicillin 500 mg 1 tab po tid x 10 days
Penicillin V 500 mg po tid-qid x 10 days







Tympanocentesis



Myringotomy



SOM OR OME


- สาเหตุ ET dys-fx (child <8 yrs) or obstruction ,infection
- CHL ไม่ปอดหู ไม่มีไข้ ไม่มีของเหลวออกจากหู
- retractionTM , air-fluid level
- pneumaticscope :
 - TM decrease movement
 - dullness of TM

SOM OR OME


- การรักษา


- ดูดซึมเองได้ภายใน 3 เดือน
- Antibiotic, decongestant/Rx.allergy
- ลดปัจจัยเสี่ยง ; ผุน ควันบุหรี่
- Valsalva maneuver
- "Myringotomy /pressure equalizing tube


ID: เป็นมากกว่า 3 เดือน , bilatCHL











chronic otitis media

เป็นภาวะที่หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง เป็นๆ หายๆ
หรือเป็นติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ๆ ซึ่งผู้ป่วย
จะมีการหลุดของแก้วหูและมีหนองไหลอย่างเรื้อรัง

เชื้อที่พบบ่อย

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Diphtheroids
Anaerobic bacteria

chronic otitis media

ชนิดของ COM

1. simple chronic otitis media (safe ear)
2. Chronic otitis media with cholesteatoma
(dangerous ear)

Symptoms & signs :

- active phase
- non- active phase
- signs of cholesteatoma :foul smell d/c
keratin debris (~~cholesteatoma~~) aural polyp
- hearing loss , vertigo

chronic otitis media

Treatment

- รักษาการติดเชื้อในหูชั้นกลาง : ให้ยา antibiotics
- ทั้งแบบหยด และรับประทาน
- ทำความสะอาดช่องหู (ear toilet) ด้วย suction
- พิจารณาผ่าตัดเมื่อ
 - มีภาวะแทรกซ้อน , รูทะลุไม่ปิดเอง ,
 - มีการติดเชื้อเรื้อรังรักษาทางยาแล้วไม่ดีขึ้น ,
 - มีการเสื่อมสภาพของกระดูกหู
- ป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อซ้ำ.. ระวังไม่ให้น้ำเข้าหู , ผ่าตัดปิดแก้วหู
- แก้ไขการสูญเสีย การได้ยิน... การผ่าตัดซ่อมแซมแก้วหูและกระดูกน้ำเสียง

