



ผลการดำเนินงานควบคุมโรคเอดส์โรงพยาบาลสอยดาวปี 2555

1.1 แผนภูมิแท่งแสดงอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่ร.พ.สอยดาว ตั้งแต่ ปี 2552 - 2555




1.2 กราฟแสดงอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่ร.พ.สอยดาว ตั้งแต่ ปี 2552 - 2555




จากการดำเนินงานพบว่า อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์รายใหม่ ตั้งแต่ปี 2553 มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย ปี 2555 พบร้อยละ 0.51 มีหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 4 คน ซึ่งพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อรายเก่าที่ทราบผลเลือดมาก่อนจำนวน 2 คน (50%) รายใหม่ที่ไม่ทราบผลเลือดมาก่อน จำนวน 2 คน (50%) ในอนาคตจะมีหญิงตั้งครรภ์ที่ทราบผลเลือดมาก่อนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการรักษาที่ได้ผลดี ทำให้มีสุขภาพแข็งแรงจึงมีความต้องการมีบุตร

1.3 แผนภูมิแท่งแสดงอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงหลังคลอดที่มาคลอดที่ร.พ.สอยดาว ตั้งแต่ปี 2552 - 2555




1.4 กราฟเส้น แสดงอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงหลังคลอดที่มาคลอดที่ร.พ.สอยดาว ตั้งแต่ปี 2552 - 2555




อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงคลอดตั้งแต่ปี2552-2554 ลดลง(0.97%,0.84%,0.48%) แต่ในปี2555 พบว่าเพิ่มขึ้น (0.64%) พบว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายเก่าที่รักษาด้วยยาต้านไวรัสอยู่ มีสุขภาพแข็งแรงจึงต้องการมีบุตร จึงทำให้อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงคลอดเพิ่มขึ้น และในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มนี้

โครงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก

1.5 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนหญิงคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัสป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก คลอดที่ร.พ.สอยดาว ตั้งแต่ปี 2552 - 2555



1.6 แผนภูมิแท่งแสดงอัตราการได้รับยาต้านไวรัสป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีมาคลอดที่ร.พ.สอยดาว ตั้งแต่ปี 2552 - 2555



การดำเนินงานโครงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกตั้งแต่ปี 2552 – 2555 พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีทุกรายได้รับยาต้านไวรัสในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด ลูกที่คลอดได้รับยาต้านไวรัสตามระยะเวลาที่กำหนดทุกคน

การติดตามตรวจเลือดเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอช ไอ วี
มีอายุ18เดือน -อายุ24เดือน อำเภอสอยดาว ปี 2555

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอช ไอ วี มีอายุ18เดือน - 24 เดือน ทั้งหมด	7	100
1.1 เด็กอายุ18เดือน - 24 เดือน มีผลการตรวจหาเชื้อเอช ไอ วี เป็นบวก	0	0
1.2 เด็กอายุ18เดือน - 24 เดือน มีผลการตรวจหาเชื้อเอช ไอ วี เป็นลบ	7	100
1.3 เด็กอายุ18เดือน - 24 เดือนปี ยังไม่เคยตรวจเลือด	0	0
2. จาก ข้อ 1		
2.1 เด็กอาศัยอยู่กับทั้งพ่อและแม่	2	28.6
2.2 เด็กกำพร้าจากพ่อเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ อยู่กับแม่หรือญาติ	1	14.3
2.3 เด็กกำพร้าจากแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ อยู่กับพ่อหรือญาติ	0	0
2.4 เด็กกำพร้าจากทั้งพ่อและแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ อยู่กับญาติ	0	0
2.5 เด็กกำพร้าจากทั้งพ่อและแม่ติดเชื้อและถูกทอดทิ้ง อยู่กับญาติ	4	57.1

ปัญหา อุปสรรค

- 1.การติดตามเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เด็กส่วนใหญ่อยู่กับปู่ย่าตายาย พ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัด มีการย้ายที่อยู่
- 2.ในปัจจุบันผู้ติดเชื้อได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมีสุขภาพแข็งแรงต้องการมีบุตรจึงทำให้อัตราการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์สูง/มีสามีใหม่ไม่เปิดเผยผลเลือด
- 3.การให้คำปรึกษาเป็นคู่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

ผลการดำเนินงานคลินิกยาต้านไวรัสเอดส์

จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส โรงพยาบาลสอยดาว
ปีงบประมาณ 2555

ลำดับ	กิจกรรม	สิทธิ				รวม
		ประกันสุขภาพ	ประกันสังคม	นอกสิทธิ(GF)	สิทธิอื่นๆระบุ(ข้าราชการ)	
1	ผู้ป่วยฯรับยาต้านไวรัสทั้งหมดตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบัน	114	6	5	3	128
2	ผู้ป่วยฯที่มีข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยยาต้านไวรัส <เฉพาะปีงบ 2553>	16	2	1	0	19
3	ผู้ป่วยฯที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส <เฉพาะปีงบ 2553>	9	2	0	0	11
4	ผู้ป่วยฯ ไม่ได้รับยาเนื่องจาก	7	0	0	0	7
	4.1 รักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเพื่อรอรับยาต้าน	1	0	0	0	1
	4.2 ตาย	1	0	0	0	1
	4.3 อื่นๆระบุ(ไม่พร้อม)	5	0	1	0	6

ตารางข้อมูลผู้ป่วยปี 2553 - ปี 2555

ประเภท	ปี 2553(ราย)	ปี 2554(ราย)	ปี 2555(ราย)
ผู้ป่วย ณ ปัจจุบัน	115	121	128
ผู้ป่วยเดิมรักษาต่อเนื่อง	97	109	121
ผู้ป่วยใหม่เริ่มยาต้านไวรัส	11	12	11
รับยาต่อเนื่อง	10	9	10
ต้องการหยุดยาเอง	1	0	1
ผู้ป่วยต้องการไปรักษาโรงพยาบาลอื่น	0	1	0
ส่งตัวไปรักษา รพศ.	0	1	0
เสียชีวิต	0	1	0
ผู้ป่วยเคยหยุดยามาเริ่มยาใหม่	3	0	0
ผู้ป่วยส่งตัวมารักษาต่อ	7	3	5
รับยาต่อเนื่อง	5	3	5
แพทย์ให้หยุดยา เพราะ poor adherence	1	0	0
เสียชีวิต	1	0	0

ตารางข้อมูลผู้ป่วยปี 2553 - ปี 2555

ประเภท	ปี 2553(ราย)	ปี 2554(ราย)	ปี 2555(ราย)
ผู้ใหญ่	110	117	124
เด็ก	5	4	4
สิทธิการรักษา			
บัตรทอง	99	107	114
ประกันสังคม	7	6	6
เบิกได้/ชำระเงินเอง	4	3	3
ไม่มีสิทธิใดๆ	5	5	5

สูตรยาต้านไวรัส			
สูตรพื้นฐาน	108(93.91%)	114(94.21%)	119(92.97%)
GPOS 30	40	9	14
GPOZ 250	24	52	51
d4T30+3TC+EFV	5	6	8
d4T20+3TC+EFV	2	3	1
d4T20+3TC+NVP	13	12	12
AZT200+3TC+NVP	4	8	8
AZT200+3TC+EFV	10	13	14
AZT300+3TC+NVP	2	0	0
AZT300+3TC+EFV	6	7	7
TDF+3TC+EFV	2	2	4
TDF+3TC+NVP	0	2	3

ประเภท	ปี2553(ราย)	ปี2554(ราย)	ปี2555(ราย)
สูตรยาต้านไวรัส			
สูตรทางเลือก			
d4T20+3TC+LPV/RTV	1	1	1
d4T30+3TC+LPV/RTV	1	1	1
TDF+3TC+LPV/RTV	1	1	1
AZT200+TDF+LPV/RTV	2	2	4
AZT300+TDF+LPV/RTV	1	1	1
AZT200+TDF+IDV/RTV	1	1	1

โรคประจำตัว	13	16	18
เบาหวาน	2	1	2
เบาหวานและความดันโลหิตสูง	0	1	1
ความดันโลหิตสูง	5	6	7
ความดันโลหิตสูงและเก๊าต์	0	1	1
ความดันโลหิตสูงและไวรัสตับอักเสบบี	0	1	0
เก๊าต์	1	1	1
ไทรอยด์สูง	1	1	0
ไวรัสตับอักเสบบี	1	0	3
ไวรัสตับอักเสบบีและม้ามโต	0	1	0
พาหะthalassemia	1	1	0
Premature unspecified contraction heart	1	1	1
Encephalopathy และ epilepsy	1	1	1
Schizophrenia	0	0	1

การดำเนินงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ปี 2553 - ปี 2555

การตรวจ	ปี 2553(ราย)	ปี2554(ราย)	ปี2555(ราย)
การตรวจ CD4	109	115	120
ตรวจCD4 2ครั้ง/ปี	84	104	106
ตรวจCD41ครั้ง/ปี	25	11	14
ติดตามผู้ป่วยมาตรวจแล้วจนเกิน	16	5	8
ปีงบประมาณ	2	0	0
ผู้ป่วยตรวจเกินสิทธิ์	3	1	1
ผู้ป่วยส่งตัวมารักษาจากที่อื่น	3	5	5
ผู้ป่วยใหม่ได้ตรวจรอบนี้1ครั้ง	1	0	0
ผู้ป่วยเก่าเริ่มยาใหม่ได้ตรวจรอบ	6	6	8
นี้1ครั้ง	1	2	1
ผู้ป่วยไม่ได้ตรวจCD4	5	4	7
ผู้ป่วยไม่มาตรวจตามนัด			
ผู้ป่วยใหม่ยังไม่ครบกำหนดตรวจ			

การตรวจ viral load (VL)	100	111	117
ตรวจ VL 1 ครั้ง/ปี	100	111	117
ผู้ป่วยไม่ได้ตรวจ VL	15	10	11
ติดตามแล้วไม่มาตรวจ	7	3	3
ผู้ป่วยส่งตัวมาจากที่อื่นยังไม่ถึง	2	0	1
กำหนดตรวจ	6	7	7
ผู้ป่วยใหม่ยังไม่ครบกำหนดตรวจ			
การตรวจ Blood biochemical	80	105	118
ผู้ป่วยได้รับการตรวจ 2 ครั้ง/ปี	0	78	102
ผู้ป่วยได้รับการตรวจ 1 ครั้ง/ปี	80	27	16
ผู้ป่วยไม่ได้รับการตรวจ	35	16	10

ผลการวัดคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี
(HIVQUAL-T)

